

蠅

一、一般生活習性：

在台灣常見的蠅類有熱帶家蠅、大頭金蠅、黃果蠅等，這些蠅類皆為腐食性。其幼蟲生活於腐敗之有機物中，如動物之排遺、動物之屍體（如內臟）或腐敗的水果、果皮、蔬菜以及廚餘等，故多見於環境衛生不良之處。蠅類成蟲喜於日間活動，有趨光性，夜間常棲於植物枝葉、電線、天花板等處；厭忌芳香油類如薄荷油、樟腦油、丁香油、檸檬油等，但喜好腥臭味，故髒亂的房舍容易引來蠅類。

二、環境管理：

- (一)住宅周圍之腐敗有機物必須立刻清除或掩埋，切勿堆積腐爛之水果、蔬菜、動物屍體、內臟及割除後的雜草等。
- (二)家畜之欄舍須每日清洗，家禽之排遺物每週應清理 1~2 次。
- (三)戶外垃圾必須密封加蓋並儘清運。
- (四)住宅周圍之農田、花圃、果園等，如施用雞糞、豆餅等有機肥或腐植質時，表面必須覆土 5 公分以上，以免蠅類孳生。

三、房舍管理：

- (一)設置紗窗、紗門。
- (二)廚餘垃圾不可倒入水溝內，應妥善包紮，投入密封垃圾筒，並儘快清除。
- (三)餐廳、廚房或食品加工廠，可裝置空氣簾幕或暗走道，以防止蠅類跟隨人員進入室內。

四、因應之道：

- (一)環境衛生不良或垃圾處理不當之社區，才有蠅類滋擾侵入室內之可能，可用蠅拍、粘蠅紙或捕蠅燈撲殺。
- (二)如未裝設紗窗、紗門，應儘量關閉部分門窗，降低室內光線，蠅類自然離去。
- (三)紗窗外或門上可噴灑市售合格罐裝殺蟲劑，以殺死棲息之蠅類。
- (四)殺蟲劑可噴於天花板、樑柱、電線，以撲滅夜間棲息於住家內之蠅類。

五、注意事項：

蠅類晚間多棲息於孳生場所附近的灌木叢、草叢等植物上，如果發生嚴重蠅害，可於夜間施用藥劑來防治，但因藥劑劑型及植物感受性不一，宜先行小規模試驗，並由專家指導為宜。