

小黑蚊

一、一般生活習性：

小黑蚊的幼蟲主要孳生於樹林、竹籬下、花生田、甘藷田、蔗田、土牆、牆縫及水溝旁、污泥等著生青苔處。雌性成蟲飛翔範圍約 500 公尺，白天吸血，每年的 6、7、8 月是成蟲最多，也是叮咬、滋擾最嚴重的時期。

二、環境管理：

- (一)清除住家附近潮溼處之青苔、土壤、腐植質。
- (二)清除住宅附近之雜草、灌木叢，拆除不必要的的棚架、竹籬、蔭棚等，減少成蟲棲息地。
- (三)疏濬溝渠、清除污泥及溝岸之青苔。
- (四)院落密植草坪或改鋪水泥、石板。

三、房舍管理：

小黑蚊喜在戶外吸血，但如有機會，亦會飛入室內吸血，因此裝置紗窗、紗門，可有效防阻之。

四、因應之道：

- (一)孳生範圍廣泛，無法全面防治。
- (二)改善社區環境，減少孳生範圍，住宅附近易生青苔處，可噴灑殺蟲劑消滅幼蟲。
- (三)日間戶外活動宜著長袖衣褲及抹防蚊忌避劑於手、臉等皮膚裸露處，並儘量避免午後 2~3 時在戶外活動。

五、注意事項：

- (一)不可以將殺蟲劑（防蚊忌避劑例外）抹於身體或衣物，以免中毒。
- (二)根據美國環保署提出警告：孕婦應避免接觸殺蟲藥劑。